LXXV International conference «Nucleus–2025. Nuclear physics,
elementary particle physics and nuclear technologies»

Saint Petersburg, Russia, July 1-6, 2025

**КИНЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
pp-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕАКЦИИ $p+{}^2\text{H}\rightarrow p+p+n$**

**Mitsuk V.V.¹, Kasparov A.A.¹, Mordovskoy M.V.¹,
Lebedev V.M.², Spassky A.V.²**

¹*Institute for Nuclear Research of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;*

²*Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Moscow State University, Moscow, Russia;*

E-mail: vyacheslav.mitsuk@phystech.edu

Измерение a_{pp} и E_{pp} в различных реакциях

Одним из проявлений эффекта НЗС (CSB) является разница между синглетными длинами рассеяния a_{pp} и a_{nn} :

- a_{pp} измеряется в реакции pp -рассеяния, также может быть измерена в реакциях с двумя протонами в конечном состоянии, например $d+{}^2\text{H}$, $d+{}^1\text{H}$ и $p+{}^2\text{H}$;

- a_{nn} измеряется, в основном, в реакциях с двумя нейтронами в конечном состоянии $n+d$ и π^-+d , но также может быть измерена в реакции $d+{}^2\text{H}$.

Измерение a_{pp} и E_{pp} в реакции $p+{}^2\text{H}\rightarrow p+p+n$ в случае углов регистрации $\Theta_p = 18^\circ \pm 2^\circ$ и $\Theta_n = 38^\circ \pm 1.5^\circ$

(А.А. Каспаров и др., ЯФ, 2025, Т. 88, № 2, с. 220–227)

Экспериментальная схема: 1 — вакуумная камера рассеяния (Φ 23 см с выходным окном из лавсана толщиной 20 мкм), 2 — мишень CH_2 (толщина 30 мкм), 3 — нейтронный детектор (Φ 5 см, толщина 5 см), 4 — ΔE -детектор (Φ 5 мм, толщина 25 мкм), 5 — E -детектор (Φ 10 мм, толщина 1000 мкм).

Энергетические корреляции $E_p - E_n$, измеренные в реакции $p + {}^2\text{H} \rightarrow p + p + n$ при $\Theta_p = 18^\circ \pm 2^\circ$ и $\Theta_n = 38^\circ \pm 1.5^\circ$.

Измерение a_{pp} и E_{pp} в реакции $d+{}^1\text{H}\rightarrow p+p+n$

(А.А. Каспаров и др., ЯФ, 2025, Т. 88, № 2, с. 220–227)

Сравнение полученного в эксперименте энергетического спектра протонов с моделированными спектрами, соответствующими $E_{pp} = 200 \pm 10$ (точечная кривая), 400 ± 50 (сплошная), 600 ± 50 кэВ (штриховая).

Проведенный χ^2 -анализ показал, что наиболее вероятное значение энергии 1S_0 pp -состояния составляет $E_{pp} = 375 \pm 5$ кэВ.

Сравнение с результатами исследований pp -корреляций, проведенных другими группами

Группа	Энергия, МэВ	Реакция	E_{pp} , кэВ
Неймеген, 1988 г.	0-30	свободное pp -рассеяние	510 ± 5 $r_{pp} = 2.85$ фм
Карлсруэ, 1969 г.	52.3	$d+^1\text{H} \rightarrow p+p+n$	550 ± 70 $r_{pp} = 2.85$ фм
Шанхай, 1992 г.	15.7	$d+^2\text{H} \rightarrow p+p+n+n$	450 ± 50
ИЯИ РАН, 2024 г.	15.3	$d+^1\text{H} \rightarrow p+p+n$	$E_{pp} = 375 \pm 5$ $\Delta E_{pp} = 70 \pm 3$

Формула для пересчета E_{NN} в a_{NN} :

$$\frac{1}{a_{NN}} = - \left(\frac{m_N E_{NN}}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} r_{NN} \frac{m_N E_{NN}}{\hbar^2} + \dots$$

Цель настоящей работы – поиск отличия низкоэнергетических характеристик pp -взаимодействия (E_{pp} и a_{pp}) в случае реакции $p+^2\text{H} \rightarrow p+p+n$ от их значений в случае свободного pp -рассеяния. Данное отличие может быть обусловлено влиянием $3N$ -сил.

Кинематическое моделирование реакции

- На первом этапе моделируется двухчастичная реакция $p + {}^2\text{H} \rightarrow (pp) + n$ при энергии пучка протонов $E_p = 7.5$ МэВ.
- Затравочная масса двухпротонной системы берётся как $M_{2p} = 2m_p + E_{pp}$.
- Искомое значение энергии pp -состояния при моделировании берется в широком интервале $E_{pp} = 0 - 0.8$ МэВ.

Кинематическое моделирование реакции $p + {}^2\text{H} \rightarrow (pp) + n$: первый этап

Были определены углы вылета pp -системы и нейтрона, соответствующие максимальной энергии протонов, что способствует лучшей регистрации протонов в ΔE - E -системе. ⁷

Кинематическое моделирование реакции $p + {}^2\text{H} \rightarrow p + p + n$: второй этап

E_n и E_p – энергии нейтрона и одного из протонов, образующихся в реакции $p + {}^2\text{H} \rightarrow p + p + n$ для случая угла вылета протона $\Theta_p=25^\circ$.
Отбор по E_{pp} проводится в интервале $E_{pp} \pm \Delta E_{pp}$.

Спектры энергии протонов для разных величин E_{pp} (300, 500 и 700 кэВ)

Кинематическое моделирование реакции $d + {}^1\text{H} \rightarrow p + p + n$: второй этап

Моделирование прохождения протонов через ΔE - E -систему в случае трёх углов детектирования протонов для нескольких вариантов значения энергии протон-протонного состояния $E_{pp} \pm \Delta E_{pp}$.

Были определены оптимальные углы вылета pp -системы ($-35^\circ \div -25^\circ$) и нейтрона ($51^\circ \div 72^\circ$), соответствующие максимально возможным в эксперименте энергиям протонов. Положительным и отрицательным углам соответствуют углы вылета влево и направо от оси пучка соответственно.

Экспериментальная установка для регистрации заряженных частиц и нейтронов в реакции $d+{}^1\text{H}\rightarrow p+p+n$

1 – вакуумная камера рассеяния,
2 – мишень CD_2 ,
3 – сборка нейтронных детекторов,
4 – кремниевый ΔE -детектор (20 мкм),
5 – E-детектор (1000 мкм),
6 – система, включающая в себя предусилитель и/или усилитель,
7 – формирователь со следящим порогом,
8 – время-амплитудный преобразователь.
Оцифровывание сигналов будет осуществляться с помощью ЦСП D500-8 отечественного производства. Планируется проведение измерений на пучке дейтронов циклотрона У-120 НИИЯФ МГУ.

Заключение и выводы

- Результаты кинематического моделирования реакции $p+{}^2\text{H}\rightarrow p+p+n$ показали, что анализ формы спектра протонов при определенных параметрах эксперимента может дать информацию об энергии протон-протонного состояния E_{pp} .
- По результатам проведенного моделирования определены оптимальные параметры эксперимента и схема экспериментальной установки.
- Предполагается проведение эксперимента по исследованию реакции $p+{}^2\text{H}\rightarrow p+p+n$ при энергии пучка налетающих протонов 7.5 МэВ на ускорителе У-120 НИИЯФ МГУ с учётом более строгого теоретического анализа.

**Спасибо за
внимание!**